

Dom zdravlja Čapljina
KLINIČKI PUT ZA UPALU PLUĆA

Ime i prezime							Br. kartona						
Faktori rizika		da	ne	da	ne	da	ne						
simptomi	Više od 65 god			Šećerna bolest		Boravak u ustanovu za kroničnu njegu							
	Virusna infekcija			Operativni zahvati		Kronično zatajenje bubrega							
	Bolesnici s KOPB			Alkoholizam		Imunokomprimirani bolesnici							
	Bolesti jetre			Pušenje		Splenektomija							
	Kronične srčane bolesti			Profesionalne bolesti									
Kliničke aktivnosti		Prvi pregled			Kontrolni pregled (3. dan)		Završni pregled (10 dan)						
		Datum	Čekanje na pregled	Čekanje u čekaoni	Čekanje na pregled	Čekanje u čekaoni	Čekanje na pregled	Čekanje u čekaoni					
Anamneza		da	ne	ostala anamneza	da	ne	ostala anamneza	da	ne	ostala anamneza			
simptomi	Suh kašalj												
	Produktivan s gnojnim iskašlajem												
	Probadanja u prsima												
	Zaduha												
	Kataralni simptomi												
	Tresavica												
	Opća slabost												
Fizikalni pregled		Prvi pregled			Kontrolni pregled		Završni pregled						
RR	puls	Temp											
		da	ne	Ostali fizikalni nalazi									
Tahipnea													
Skraćen plućni zvuk													
Hropci													
Krepitacije													
Muklina													
Laboratorij													
	vrijednost		vrednost	vrednost			vrednost	vrednost					
LE		RTG											
DKS		* iskašlaj											
SE													
CRP													
Dijagnoza													
Odsutstvo s posla													
Pacijent je upućen u bolnicu			da <input type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	da <input type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	da <input type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>					
Lijekovi			Inicijali		Inicijali		Inicijali						
Edukacija		✓		✓	✓	✓	✓	✓					
Usmena uputstva		Pisana uputstva											
Odstupanja													

Postignuti ciljevi								
Poboljšanje klin.slike	Poboljšanje lab.nalaza	Izlječenje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pogoršanje klin.slike	Pogoršanje lab.nalaza							
Komentar								
Potpis ljekara i medicinske sestre								

*Pretraga se izvodi kod imunokompromitiranih bolesnika

Uputstvo za popunu obrasca

Klinički put se u okviru mogućnosti oslanja na kliničke dokaze. Gdje oni ne postoje, on se oslanja na najbolju kliničku praksu. Unatoč tome klinički put je upuštvio i nije nepromenljiv. Odstupanje se definije kao skretanje sa kliničkog puta koje je toliko značajno, da ga je potrebno razmotriti na narednom stručnom sastanku zato što može dovesti do izmjene kliničkog puta ili se od člana tima može zahtijevati da promijeni svoj način rada. Odstupanja treba da su predmet periodične evaluacije tima. Značajno odstupanje se obavezno upisuje u obrazac. Unosi se datum i vrijeme odstupanja i upiše napomena, zašto je došlo do odstupanja. U zavisnosti od prirode odstupanja upisuje se i završetak.

Svi članovi osoblja dužni su upisati ime, prezime i potpisati se na označenom mjestu, po okončanju aktivnosti za koju su zaduženi. Kod svakog pregleda ispunjavaju se sve alineje anamneze i fizičkog pregleda.

Pored izvršene aktivnosti stavla se kvačica (✓) kao dokaz ili zaokružuje odgovor Da ili Ne. Na nekim mestima potrebno je upisati podatak.

IZVANBOLNIČKA PNEUMONIJA		KARAKTERISTIKE
PRIMARNA u zdrave osobe bez poticajnih čimbenika SEKUNDARNA bolesnici sa COPB prisutni poticajni čimbenici	ATIPIČNA	Pretežno bolest školske djece i mladih odraslih ljudi Simptomi: temperatura, mijalgija, glavobolja, suhi kašalj, rijetke komplikacije Auskulatacija: često normalna, sitni hropci Liječenje: ambulantno simptomatska terapija: antipiretici, analgetici pp, prestanak pušenja; empirijski izbor lijekova: Azitromicin 500 mg x 1 p.o. / 3 dana ili Klaritromicin 500 mg x 2 p.o. / 10 dana ili Doksiciklin 100 mg x 2 p.o. / 10 dana Rtg : nježna mrljasta, neoštrot ograničena sjena
	BAKTERIJSKA	Simptomi : visoka temperatura, produktivan kašalj (gnojan), probadanje u prsima, Auskultacija : obilan nalaz Liječenje: ambulantno, simptomatska terapija: antipiretici, analgetici pp, prestanak pušenja; empirijski izbor lijekova: *prokain- penicilin 1,6 mil i.j. i.m. / 10 dana ** Koamoksicilin 1,2 g iv / 10 dana- nakon pada temp 1g x 2 po Cefuroksim 1,5 g x 3 iv / 10 dana- nakon pada temp 500 mg x2 po ili Ceftriakson 2g x 2 iv / 10 dana- nakon pada temp cefiks 400 mg x 1 po Rtg : homogena ograničena sjena

* < 65 god, bez kroničnih bolesti

** > 65 god. i < 65 sa kroničnim bolestima

Uputstvo za pacijente UPALA PLUĆA

Gotovo više od 70% svih bolesti otpada na infekcije respiratornog sustava. Među njima posebnu pažnju zaslužuje upala pluća kao jedna od najtežih.

Obolijevaju djeca i odrasle osobe u svakom životnom dobu, ali su posebno ugrožene osobe starije od 65 god., osobe koje imaju druge kronične bolesti i koje imaju kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB), pušači, dijabetičari, lica koja su boravila u bolnici, kao i oni koji imaju smanjen imunitet (bolesnici na dijalizi, HIV bolesnici i lica koja nemaju slezene).

Nastaje u svim godišnjim dobima, a dosta je česta nakon virusnih infekcija respiracijskog sustava (prehlade, grip i dr.).

Bolest može biti uzrokovana raznim mikroorganizmima, virusima i bakterijama.

Simptomi i znaci bolesti

Bolesnici koji imaju upalu pluća kašljaju, u početku suho, a kasnije i sa iskašljavanjem, ponekad gnojnim. Dolazi do porasta temperature, koja može biti i veoma visoka, nerijetko praćena tresavicom. Disanje je otežano, a mogu se javiti i probodi u grudnom košu.

Osobe koje imaju upalu pluća, nerijetko imaju opću slabost i malaksalost, bolove u mišićima i glavobolju, kod male djece i povraćanje.

Dijagnoza i liječenje

Za postavljanje dijagoze bolesti često je dovoljno da se javite obiteljskom liječniku, koji će na osnovu vaših simptoma, pregleda i nalaza odrediti liječenje. Nalazi koji su potrebni su laboratorijski i rentgensko snimanje pluća.

U toku liječenja je neophodno priržavati se tačnih uputa vašeg liječnika. Prije svega morate mirovati za vrijeme bolesti, uzimati dovoljno tekućine i ukoliko pušite obavezno se uzdržavati od duhana za vrijeme liječenja. Za obaranje temperature i protiv bolova, uzimajte lijekove koje vam je odredio liječnik.

Upala pluća se uspješno može izlječiti, ali samo sa redovnim uzimanjem propisanih antibiotika. Pridržavajte se uputa i redovnih kontrola sve do kraja bolesti.

Za starije osobe i lica koja imaju kronične bolesti se preporučuje svake godine cijepljenje protiv gripa, jačanje imuniteta općim mjerama (fizička aktivnost, pravilna ishrana, redovit odmor) i prestanak pušenja.