

**JZU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM  
„Dr Mustafa Šehović“ TUZLA**

<b>NASLOV PROCEDURE:</b> <b>NAVLAČENJE LIJEKA IZ BOĆICE I AMPULE</b>	<i>Strana 1/2</i>
<b>VRSTA PROCEDURE:</b> <i>Procedura operativnih polja</i>	Jedinstveni broj procedure <b>186/11-1</b>

Važi do:  
*decembra, 2014. godine*

## **1. OPŠTA IZJAVA O POLITICI**

Ovom procedurom definiše se postupak navlačenja lijeka iz boćice ili ampule pomoću igle i šprice za subkutanu, intrakutanu, intramuskularnu i intravenoznu primjenu.

## **2. PODRUČJE PRIMJENE**

Sve službe u kojima se ordiniraju parenteralna terapija.

## **3. DISTRIBUCIJA I NADZOR**

- 3.1. Neposredni rukovodioci su obavezni da sa ovom Procedurom upoznju svoje osoblje.
- 3.2. Ova Procedura mora biti postavljena na mjestu dostupnom svim zaposlenicima.
- 3.3. Neposredni rukovodilac vrši kontinuirano nadzor nad primjenom ove procedure.

## **4. PROCEDURA**

- 4.1. Postupak provodi jedna medicinska sestra/tehničar.
- 4.1.2 Navlačenje pripremljenog, pismeno ordiniranog lijeka ili otopine obavlja se pod aseptičnim uslovima.
- 4.1.3. Lijek može biti u boćicama i ampulama, kao gotovi pripravak ili u obliku praha, kojeg otapamo prije navlačenja u špricu ili infuzionu bocu. Lijek je potrebno primijeniti odmah po navlačenju.

### **4.2. Procjena**-prije pripreme lijeka potrebno je procjeniti:

- ispravnosti pakovanja lijeka
- provjera naziva lijeka
- provjera roka upotrebe lijeka
- načina primjene i koncentracija otopine prema uputi na prospektu i uporediti sa receptom lijekra.
- izgleda otopine (organoleptička svojstva, ne isprobavati okus)
- radnog prostora i površine za provedbu postupka (mikroklimatskih uvjeta, osvjetljenja, mira)

### **4.3. Priprema**

#### **4.3.1. Priprema pribora i materijala;**

- tacna ili kolica,
- lijek,
- sredstvo za dezinfekciju površina,
- šprica i igla potrebnog lumena i veličine,
- smotuljci vate ili gaze,
- alkoholni dezinficijens za ruke,
- posuda za nečisto,
- sabirnik za oštре predmete.

#### **4.4. Izvođenje postupka navlačenja lijeka iz ampule**

- 4.4.1. Iz gornjeg dijela ampule polukružnim pokretom istresti lijek u donji dio ampule.
- 4.4.2. Smotuljcima vate natopljenim u dezinfekcijsko sredstvo dezinfikovati vrat ampule.

- 4.4.3. Odlomiti vrat ampule prema oznaci na vratu ampule.
- 4.4.4. Spojiti iglu sa špricom, uroniti iglu u ampulu do dna ampule i navući lijek.
- 4.4.5. Ne izvlačeći iglu iz ampule, okrenuti špricu okomito i istisnuti mjehuriće zraka u ampulu, pazeći da se ne istiskuje lijek.
- 4.4.6. Upotrijebljenu iglu odložiti u spremnik za oštare predmete.
- 4.4.7. Staviti novu sterilnu iglu odgovarajućeg lumena sa štitnikom na špricu, ampulu sačuvati do završetka aplikacije lijeka, a zatim je odložiti u sabirnik za oštare predmete.
- 4.5. Izvođenje postupka navlačenja lijeka iz boćice**
- 4.5.1. Oprati ili dezinfikovati i posušiti ruke.
- 4.5.2. Odstraniti aluminijski ili plastični poklopac s boćice. Dezinfikovati čep boćice smotuljkom vate ili gazom natopljenom dezinfekcijskim sredstvom.
- 4.5.3. U špricu navući propisanu količinu otapala i kroz gumeni čep uvesti iglu u boćicu i utisnuti rastvarač.
- 4.5.4. Ostaviti iglu i špricu u boćici (u špricu će ući nešto zraka radi povećanog pritiska u boćici - ne odvajati iglu od šprice i boćice).
- 4.5.5. Lagano rotirati boćicu i pričekati da se lijek otopi. Držati boćicu okomito klipom šprice prema dole. Rotirati boćicu i pričekati da se lijek otopi
- 4.5.6. Držati boćicu okomito klipom šprice prema dole, utisnuti zrak iz šprice u boćicu i pažljivo povući iglu do nivoa čepa.
- 4.5.7. Lagano navući lijek u špricu i istisnuti preostali zrak nazad u boćicu.
- 4.5.8. Odvojiti iglu od šprice i boćice i odložiti je u spremnik za oštare predmete
- 4.5.9. Staviti sterilnu iglu odgovarajućeg lumena sa štitom na špricu, sačuvati boćicu do kraja aplikacije lijeka.
- 4.6. Oprati i posušiti ruke.

## 5.0. REVIZIJA:

Revizija ove procedure vrši se svake 3 godine.

Uradi	Ime i prezime / radna grupa	Verifikacija (potpis)
Pregledao/saglasan		
Odobrio		Datum usvajanja

M.P.